


DE
CATALEPSI.

DISSERTATIO
INAUGURALIS PATHOLOGICA
QUAM
CONSENSU ET AUCTORITATE
MAGNIFICI DOMINI
PRAESIDIS ET DIRECTORIS
SPECTABILIS DOMINI DECANI
NEC NON
CLARISSIMORUM DOMINORUM PROFESSORUM
PRO RITE OBTINENDA
MEDICINAE DOCTORIS LAUREA
IN ALMA AC CELEBERRIMA REGIA SCIENTIARUM
UNIVERSITATE HUNGARICA
PUBLICAE ERUDITORUM DISQUISITIONI SUBMITTIT
J. MAURITIUS MARKESTEIN
HUNGARUS SZEREDIENSIS.

In Theses adnexas disputabitur die Martii 1844.

PESTINI
TYPIS JOS. BEIMEL.



ÉRTEKEZÉS

A'

DERMENGÉSRŰL.



IRTA

MARKSTEIN MÓRICZ.

ORVOS DOCTOR.

Quum una sit ars quae corporis hominis tuendo dicata sit, ut
alibi a nobis ostensum est: eius primae ac maximae partes sunt
duae, quarum alteram sanitatis tuendae, alteram morbi profligandi
facultatem appelles.

Galenus.

MÉLTÓSÁGOS
GALANTHAI GRÓF

ESTERHÁZY KÁROLY

FRAKNÓ VÁRA ÖRÖKÖS URA, SZENT ISTVÁN
APOSTOLI REND KIS KERESZTESE, CSÁSZÁRI
KIRÁLYI KAMARÁS, 'S TEK. TOLNA VÁRMEGYEI
FŐ-ISPÁNY UR,

Ő NAGYSÁGÁNAK

MINDEN SZÉP , JÓ ÉS NAGY
PÁRTOLÓJA ÉS ELŐMOZDITÓJÁNAK
TUDOMÁNYOS MUNKÁLKODÁSA
ELSŐ ZSENGÉJÉT

MÉLY TISZTELETRÉ ÉS HÁLÁJA JELEÜL

AJÁNLJA

a' Szerző.

N e v e z e t.

Dermengés, görög nevét *καταληθις* veszi ezen szótól *καταλαμβάνεσθαι* = fogva; latinul: Catalepsis; catalepsia; comprehensio; aphonia Dioclis; anaudia Antigenis Cleophanti; dormituriens vigilia Werlhofii, coma vigil Wepferii; — németül: Starrsucht, Staunen, francziánul: catalepsie; — angolul; catalepsy, trance; — belga nyelven: Verstyving.

Dermengés a' legritkább kórok' egyyike, annyira hogy Sennertus állítása szerint csak igen kevés orvos' gyakorlatában fordul elő; Tissot pedig, mint vallja, terjedelmes gyakorlatában a' dermengésnek némelly jeleit, de a' kórt egészen kifejlődve nem látta. — Frank József midőn 1802 és 1803-ban Európa' nagyobb részét beúta, a' sok ezer látott betegek közt egyet sem látott dermengőt. Hogy azonban e' kór még is létezik, azt a' több jeles, és hiteles orvosok által felhozott számos példák eléggé bizonyítják.

Hajdan is esmeretes volt e' kór; már Hippocrates említ egy példát, hol e' kór némelly jelei mutatkoznak; Galenus pedig egy e' kórban szenvedő tanulóársáról tesz említést. Egyéb nemzetek orvosai is a' jelen időkig idéznek e kórból eseteket. Hogy e kór időkben is előfordul, nem szenved kétséget; magam esmerék egy nőt, kinél e kór több jelei mutatkoznak, egy más, egészen kifejlődött dermengés esetét, melly 1841-ben a' bernai kórházban fordult elő, jó barátom közlé velem.

K ó r j e l t a n.

Előre bocsátom itt e kórnak Frank József által tett meghatározását, mellyen minden időbeli orvosok éltek, 's imigy szól:

A' dermengés az érzékek', és mozgás' rögtöni megszünése, úgy hogy a beteg azon helyzetben, mellyben a kór kezdetén volt, megmarad, s tagok hajlékonyak, és a kül erő által, nyert helyzetöket megtartják; az érverés, és légzes rendes állapotban maradván.

A' dermengés vagy tökéletes, vagy tökéletlen, a mint t. i. a kórjelek mind, vagy csak némelyek kifejlődvék.

A' kórjelek három félék: előkórjelek, roham alatti kórjelek, és roham utáni kórjelek.

Előjelek. Ezen kór előfordult eseteinek leírásaiban a rohamot megelőző jelekről igen kevés, és többnyire csak az egyéb ideges bajokat is megelőzni szokottak említettnek, u. m. fáradtság, szédülés, fő s nyakszirtfájás, undorodás, és a' végtagok nehéz mozdítása; — megjegyzendő azonban hogy ezen kór kifejlődött esetei leírásában az előjelekről semmit, de annál többet találtam a' tökéletlenül kifejlődött esetek' leírásában. Így Forestus egy betegnél megelőző tartós fájdalmakat említ; Dolaeus szellő érzetről, ásitózásról, és arcz pirosságról beszél, a hol a dermengés kórjelei kétség kívül nehézkórral voltak összekötve; Frank József a dermengésnek egy tökéletes példáját említi, melyben megelőző szorongásról szól. Több leírásokból kiválglik, hogy e kór rögtön minden előjelek nélkül is megtámadja a beteget, mely vélemény az is igazolni látszik, hogy az illy betegek többnyire valamely kezdett munkájok közepette lepetnek meg a' roham által, és sokaknak a' roham megszűntével erről tudomásuk nincsen; mint azon pap, kiről Hirschel (*Gedanken über die Starrsucht. Berlin, 1796*) írja, hogy az úrimádság első szótagát mondván, a' dermengés lepte meg, a roham megszűntével pedig a 2-dik szótagon kezdve folytatta imádságát. Mit már a kór lényege is magával hoz.

A' roham kórjelei. Az agy minden működésének, a külérzékek', és a' szabad akarattól függő mozgások' megszűnése. Ebben alapszik a kór' neve *καταληψις* a *καταλαμβάνω*, mivel a' régiek, véleménye szerint e kórban az agy működése valamely anyagi ok által van lekötve. Az idegek illy állapotját semmi más kórban így nem találjuk, kivévén talán az ájulást, mely azonban még is a' dermengéstől nagyon különbözik.

Az agy működésének megszűnése tökéletes; a' betegek a rohamról, ha bár napokig tart is, mit sem tudnak, a roham előtt kezdett dolgaikat folytatják, sőt a kezdett szót is a roham után végzik. Méltán mondja tehát Tissot: Ha a beteg a roham után ezalatti gondolatjait beszéli, szintetnek lehet a kórt gyanítani.

Az idegek' érzékenysége is egészen el van nyomatva, mi az agy' munkálódása felfüggesztésének természetes következménye. — A' kísérletek tanítják, hogy a' legerősebb

bőr ingerek, sőt az égő peccsétviasz alkalmazása sem képesek legkisebb mozgást, vagy érzékenység' jelét előhozni; a' szemgolyó megillettelvén, vagy megszuivatván, a' szemhéjak még is nyitva maradnak; a' Schneider-hártya izgatására tüsszenés nem következik. — A' szemfény mozdulatlan annyira, hogy a' rögtöni világosság által sem mozdul. A' belek hártyái is érzéketlenek, mit a' Sachse által (Horn's Archiv 1829) felhozott példa, melly szerint egy leánynál a roham alatt a bevett hánytató sikernélküli volt, bizonyítja. A' tapintáson kívül a' többi külérzékek is, a' látást és hallást sem véve ki, megfosztvák működéseiktől.

A' kórjelek közt különös tekintetet érdemel a mozgás köre, melly a' kórismertetre nézve igen fontos, minthogy semmi más kórban elő nem fordul. Megmarad t. i. a test a roham kezdetén volt helyzetében, a' tagok pedig külső erőnek viasként engednek.

A' légzés azomban, és vérkeringés fenmaradnak; mert ezek megszüntével olly körülmény állna be, melly az esetet a' kórok sorából szükségkép' kizárná. — A' mozditó tehetőségnek e' két eredménye akarattól nélkül is, az agy' működése megszüntével, vagy tökéletes hiányával is megtörténik; mint az a fejevelt békákkal tett kísérletek — és a fejetlen állatok alkotásából kiviláglik. Fontos körülmény itt az is, hogy a' légzés a' roham által változást nem szenved, holott más esetekben az öntudat megszünténél a' légzés' változása tapasztaltatott.

A' vérkeringés is, mint a' szív, és üterek mozgása mutatá, gyakran ollyan mint egészséges állapotban; más esetekben pedig lassú, kicsiny, és gyengének táltatott, mi az agynak a' véredények' idegeire ható, tagadhatlan befolyásából könnyen magyarázható.

A' bélmozgásról mit sem találtam a' leírásokban; lassúbbnak látszik azomban, mert a roham alatt, ha mindjárt 24 óráig, vagy tovább is tartott, székelés nem történt. Ezt igazolni látszik az is hogy a beadott, hánytató a roham alatt visszahatásra nem talál. A' tökéletesen kifejtett dermengés Richter és De Haen szerint még két a bélcsőn észreveendő kórjelet tüntet elő, 's ezek; a' garatba vitt tápszerek' lenyelése, és a' végbél nyílásának erős bezáródása minél fogva az allövet alkalmazása mindig lehetlen. A' tápszert megrágni, az az akarattól függő mozgást tenni nem képesek; hanem az apróra vágott vagy hig ételeket lenyelik; minthogy a nyelés olly mozgás, melly az agy befolyása nélkül származhatik, mint az a fejetlen álla-

lok nyeléséből, és a fejük vett békakkal tett kísérletekből, melyek szerint a hárszing izmai az alkalmazott ingerre összehuzódnak, kitetszik.

Szék' es húgy kiürítés sehol sem tapasztaltatott a roham ideje alatt, mellynek oka a zárizmok erős összehuzódásában keresendő.

A' kórjelek között a mozgásra nézve légjellemzőbb az, miszerént a beteg azon helyzetben marad, mellyben őt a' roham találta. Ennek oka az akarat által az izmokra gyakorlott befolyásnak felfüggesztésében létezik; szükséges hogy minden tag egyszerre mozdulatlanúl bizonyos helyzetben maradjon, és hogy a test nyert helyzetét ha csak külerőszak nem változtatja, az egész roham' lefolyása alatt megtartsa. — Számos példát lehet erre megerősítésül felhozni. Többi közt Van Swieten (Comment. §, 1037) mondja: Minap történt, hogy egy előkelő beteg tanácsadó orvosa házából távozni akarván, a küszöbön a rohamtót meglepetve néhány perczig mozdulatlanúl állott, a roham elmúltával pedig haza ballagott a' nélkül hogy tudta volna a történeteket. Schrödter (Salzburg. Medec. Chir. Zeitung 1794) atyjának elbeszélését idézi: Midőn ügyfelemmel a betegeket látogatnám, feltűnő volt többi közt egy vadásznak minthogy 25 éves gyermek ágyban fekvő, dermengésben szenvedő neje, ki szülés után harmadnapra férje helytelen kívánságának eleget tenni kívánván, minden érzék és mozgás nélkül ugyan azon helyzetben merevedten maradt; szemei nyitva valának ugyan de látásuk nem vala; a tagok a melly helyzetbe tétettek, abban megmaradtak. A roham 8 óra múlva megszűnt, és az asszonynak a roham alatt vele történetekről tudomása nem volt.

Elhhez hasonló kórjel más betegségekben nem mutatkozik; némelly lelki bajokban még is tapasztaltatott, úgy mint az erős, mély gondolkozásban, hol néha semmi érzéki benyomások fel nem vétetnek a' nap' foglalkozása észre nem vétetik, az óra' ütése nem hallatik, a kellemetlen szag nem éreztetik 's a't. — Továbbá, kiki tudja hogy az éles gondolkozásnak utóbb mit sem gondolás a' vége. A' gondolatoknak szeretett tárgyak körüli heves foglalkozása is szokott néha illy állapotot előhozni. Hasonló hatása van az irtóztatókróli gondolkozásnak. — A' hirtelen rémülés is a' dermengéshez hasonló állapotot idézhet elő, mellyről Van Swieten: *summo terrore homo sic afficitur ut in catalepsi, nam obstupescit vox fancibus haeret, membra mo-*

vere nequit. Veteres igitur homines capite Medusae conspecto lapides factos esse dicebant.

Némelly halál' nemében is a tagok azon helyzetöket, mellyben az öldöklő vész a' testet találja, megtartják. Így Cordanus 8 kaszásról beszéli, hogy midőn fa alatt ülve falatoznának a' villám sújta meg őket, és mind megtarták azon helyzetöket mellyben ülének; úgy hogy az egyik éppen a' falatot, másik a poharat vivé szájához's a' t. Mondják, hogy a széngőz által okozott halál is illy jelekről ismerhető.

Az izmok' ezen állapotján alapszik még két minikai jelenség is, mellyeknek a szerzők nagy fontosságot tulajdonítanak, u. m. 1-ő az arczvonások sem a' roham' beköszöntése, sem befolyása alatt nem változnak; a' szemek nyitva maradnak; 2-ik a' tagok' viaszkénti hajlékonysága. Egészséges állapotban a hajlító külerő megszűnván, a tagok mind kifeszítő, mind összehúzó izmai az akarat' befolyása nélkül súlyegyen es állapotba jönnek, azaz, össze nem húzódnak, vagy össze húzódva nem maradnak, hanem a' felemelt tag leesik. Nem így a' dermengésben; mert itt az érdeklött izmok az akarat' befolyása nélkül is súlyegyen es állapotukat, vagy összehúzódásukat megtartják, a mint t. i. a tagok külső erő által vagy kifeszítettnek, vagy összehajlítottak. Az izmok' összehúzódása tehát a legközelebbi oka a tagok' ugyan azon helyzetbeni maradásának. — E jel csak a dermengésben látható; mert még a búskórbau (Melancholia attonita) is a felemelt tag leesik. A hagymázban (typhus) ugyan látható ilyen jel, leginkább a nyelven, mert ha a nyelv a szájból kitolatik, künn marad, mint küzönségesen mondatik, a beteg elfelejti visszahúzni. Senki sem említi, vallyon a test a súlyegyen szabályaival ellenkező helyzetét megtartja é? kivéven Sachse-t, ki azt állítja, hogy betege a legtermészetellenesebb állásban is megmaradt. — Hiában keressük az élettan szerzőinek főnökeinél e két körjel magyarázatát; a régiek a szerint mint a kórt megismerték, külömbféleképen magyarázták; az ujabbak a görösök sorába számíták, de elfeledék hogy a görös mindég az idegek' felmagasztaltságával, és az izmok' merevenségével (rigiditás) jár. Végre azon kényelmes szóban nyugvának: Nem tudjuk!?

A rohamok' tartóssága nem csak külömféle egyéneknél, hanem ugyan azon betegeknél is külömféle. Így Behrends egy betegnél 18 óraig tartó rohamot tapasztala, az utána következettek rövidebbek valának, ngyhogy végtére egy óra alatt több apróbb rohamok valának észrevehétők. — Van

Swieten 3 — 4 percznyi rohamokat látott. **Tissot** 4 óráig, **Aetius** 3 napig tartó rohamot tapasztalt. Sokan állítják, hogy a betegek a szünet alatt, melly szinte különböző ideig tart, jól érzik magokat, mi nagyon világos, mivel az illy szenvedő egyének a rohamról, mellyet kiállottak, mit sem sejtve, folytatják kezdett munkáikat. **Tissot** a szünet ideje alatt lévő tökéletes egészségről szoll. **Sachse** pedig egy illy beteget a rohamon kívül igen jó kedvűnek tapasztalt.

A dermengés magában véve nem egy könnyen okoz halált. Az elholtakban külömbfélék találtattak: az agy vér- edényei duzzadtságá 1); vérömlény, és savós izzadmány az agy üregekben 2); az agy külömbféle részeinek kemény- edése 3), és sok más életműves elfajulás az agyban és tü- dőkben, a májban, és leginkább a petefészkekben. — Jól idézhetők itt **Andral** szavai az agy bajairól 4): „Zuweilen liefert die pathologische Anatomie gar keine Ergebnisse in Fäl- len, wo sehr beträchtliche Störungen der Funktionen des Ner- ven-systems Statt gefunden hatten, oder es zeigt sich nur eine und dieselbe Abweichung, wo während des Lebens die ver- schiedensten Störungen wahrgenommen waren, oder endlich findet man sehr verschiedene Abweichungen, wo noch dieselben Symptome vorhanden gewesen waren.

A dermengésnek többféle szöveményei emlittetnek a könyvekben; leggyakrabban a holdkórossággal szövetkezik. **Petetin** első függeszté erre figyelmét, és a kór' ezen nemének „*Catalepsie hysterique*“ nevet ada. **Re- nard** (*Journ. der pract. Heilk. v. Hufeland. Bd. XL.*) három illy esetet említ gyakorlatából. — **Sachse**, **Wepfer**, és **Behrends** szinte illy esetekről irnak. Mint ezen esetek abban egyeznek meg, hogy a rohamot különféle görcsös vonaglások, de leginkább *Opisthonus* előzi meg, gyakori változásokkal mint a Méhkornál szokott lenni; gyengébb vonaglás után t. i. a' test némelly részei, külö- nösen pedig a szivgödör, az orr- és nyak hegyei rendkívül felmagasztalt érzékenységgel bírnak, az öntudat hiányával az ábránd is felmagasztaltatik; e' két körjel az állati mag- netismusban keresendő. Több illy esetben a' betegek ver- selnek, vagy az apostolok mondásait illő tagjáratatással szavalják el. Illy betegek többnyire viruló korbeli, és bizo-

1) **Hollerius** comment. in Hippocrat. p. 66. — 2) **Schenk** de causis cataleps. Lib. 1. — 3) **Sprengel** Handbuch der Pathol. Bd. IV. 4) **Grundriß** der pathol. Anat. Bd. II.

nyos lelki hajlam nélküli nőszenélyek voltak. A' hőség mindegyiknél hiányzott. Sachse által említett illy beteg nő igen ingerlékeny volt az ércz érintésre, melly bizonyos módon alkalmazva a rohamuak véget vetett. Petetin, és Renard illy betegek orruk hegyét meglehellve öntudatra hozák őket. Illy eseteknél azomban mennyit kellessék a női tettetésnek, mennyit a betegségnek tulajdonítani, nehéz lenne meghatározni. De, hogy az említett állapot nem dermengés, hanem nagyobb fokú mélikór, azt magok a körjelek mutatják; midőn t. i. az akarat ereje megszűnik, a' duzrendszer pedig annál nagyobb hatásra emelkedik.

A dermengés többi szöveményei kevésbé fontosak.

O k t a n.

Hajlami. okok. Ami az életkort illeti, 30 közül, kiknél az életkor feljegyeztetett, 3 a felserdülés előtt, 24 a felserdüléstől 30-ik évig, 2 pedig a 40 és 50 év közt vala.

A' nőnemnél gyakoribb e kór mint férfiaknál; mert 36 között 26 nőszenély találtatott.

Semmi életmód, vagy foglalkozás sem látszik e' kór alól kivéve lenni. — Örökös kórnak sem mondhatni; égitestek' befolyása sem tapasztaltatott.

Az ingerültség, komorság, babonaság, romlott hitvallás, aggodalom, és elmét feszítő foglalatosságok, mellyek a' dermengésre hajlamot szülnek.

Többször megelőzőleg a hőség' rendetlensége tapasztaltatott, melly azomban nem, mint ok, hanem inkább mint együttjáró következmény tekintendő. Ezt mondhatni a megelőző vérmességről, bélsatorna tisztatlanságáról, és belférgekről.

Alkalmi okok. Leghelyesebben anyagiakra, és szellemiekre osztatnak.

Az első közé, mint leghatályosabb sorozandó a hőség' rendetlen folyása, vagy elrekedése. Már fellebb említém, hogy a dermengés, és a' hőség' rendetlensége ugyan azon okból származhatnak; nem tagadhatni azomban, hogy a hőség' rendetlensége a dermengésnek oka is lehet, midőn tudván milly befolyása legyen a hőség' rendetlenségének a' nők' lelkületére.

A vérmesség szinte mint anyagi ok tekinthető; mert 4 esetben bő orrvérfolyás után a' kór eltűnt.

Belférgek: Van Swieten egy 40 éves asszonytól mondja, hogy épen midőn gesztenyet sütné, rögtön a

dermengés lepte meg; de néhány eleven belféreg menvén el tőle, egészséges állapotja vissza tért, a' nélkül hogy a roham alatt vele történeteket tudta volna. Ezen oknak a' dermengéssel való viszonyáról nem mondhatni többet mint azon viszonyról, melyben a nehézkorral áll.

A petefészkek baját Renárd leggyakoribb oknak vallja, és egy ideglázban szenvedő nőről említi, hogy dermengéstől lépetett meg; halála után a jobb oldali petefészkek genyedésben, a' bal oldali pedig izzadmányos állapotban taláztatott, — mely jelek az előre ment petefészkek-lobra mutatának. — Lehet e a petefészkek-lob kórjeleit úgy eltitkolni, hogy észre ne vetessenek?

Frank Jós. egy törvénytánuolt említi, ki önfertőztetés következtében dermengő lett.

A váltóláz is többektől mint ok említetik. Klaunig egy 40 éves férfiről szól ki váltólázban, mely később folytonos sorvasztóvá lett, szenvedvén, a dermengés valódi jeleit mutatá, midőn kiterjesztett karok - és lábokkal mint villám sajtott jéghidegen minden érzék nélkül fekvék hanyatt az ágyban; szája erősen bekucsolva, szemei pedig nyitva mozdulatlanul maradván.

Az anyagi okokról a' szellemiekre mintegy átmeneteket képez a' melikór.

A lelki okok közt leggyakoribbak az aggodás, és szomorkodás. Tissot is ezeket mint leggyakoribb okokat említi; Schönb erg állítása pedig: „nec abludit catalepsiss a melancholia“. —

Tekintsünk csak egy gónd- és bútól elnyomatott lelket, milly korlátozva ott a gondolatok, mint hágy alább a szabad akarat, milly csekély hatással bír a jelen és múltnak emlékezete; 's látandjuk, miként illy befolyások az agy működését elfojtják.

Ide tartozik még a boldogtalan szerelem is. Két esetben ugyan is addig tartott a kór folyama, míg nem az ifjú szerehnesek bizonyossá tettek kedveltjeik megnyerése felől.

Redolenti us példát hoz fel, hol ellenszenv okozta a' dermengést. Egy 16 éves leány t. i. összekelni kénytelenítvén egy nem igen kedvelt ifjúval, csak 8 napig élt vele, s bánatjában midőn férjére gondolt, vagy felőle hallott, sőt ha tudtán kívül is hozzá közelített a nélkül hogy látta volna (?) a' dermengés jelei mutatkozának rajta 's a' t.

Frank Jós. olaszthonban egy dermengő szerzetestől ki tanácsát kérte, érté hogy a növendék papság közt gyakrabban előfordul a dermengés.

Rémülés. Marx egy szelgáról mondja, hogy ura házát égni látván, dermengésbe esett.

Az elnének megerőltetése is néha dermengést okozni tapasztaltatott; sőt némelly dolgokkali mélyebb foglalkozás is; mint Wepfer egy ifjúról beszélt, hogy valahányszor verselt, vagy mathesisel foglalkozott, a dermengés fogta el.

Közelebbi okok. A baj fészket mind a régi, mind pedig az újabb szerzők egyhangúlag az agyvelőben keresik, A régiek többnyire a' tarko mirigyben lenni vélik, így Boerhave, B. Albinus, Ackermann; Sernestus az állati pára fagyában, Gundramm pedig az érző idegek gyökereinek görcsében leli a dermengés legközelebbi okát. Richter pedig így szóll: *Sollte vielleicht in der Starrsicht die Einwirkung nach außen gehen, nicht innerhalb der Gränzen des Organismus bleiben, diesen gleichsam verlassen, und sich in unendlichen Räumen verlieren? Wirklich scheinen cataleptische völlig unbeseelt's a' t.*

Hogy a dermengés göres legyen, tagadom, mert a görcs csak az izmok' felmagasztalt munkássága mellett gondolható. mellyet mindenkor bágyadtság követ, mi a dermengés rohamai után soha sem tapasztaltatott.

Az élet' — és kórtan' nyomain, a' következő mondatok mellékelhetők még ide:

1-ső A kór az idegrendszerben gyökeredzik.

2-or A beteg rész valamelly középponti rész, azon szabály szerint: minél több ideg szenved, annál közelebb esik a' kór forrása a' középponthoz.

3-or Nem a főmozdító kór szenved

4-or A fő érző tehetség sem látszik szenvedni. Semmi objectivas jelünk nem lévén, bizonyost nem állithatunk.

5-dik Az agy főműködései elnyomatvák, mert a roham rögtön jő, és szűnik meg, a betegek a rohamról, és az idő alatt történekről mit sem tudnak.

Főleg az észrevevő, és akaró tehetség szenvednek. Ezt ha megalapítjuk, a dermengés' minden jelei magyarázhatók. Mert ha az említett tehetségek nem működnek, akkor az öntudat, és gondolkodó erő is szunyad. Hol legyen ennek oka, nem taglalom, úgy látszik azonban hogy az agynak is nyúlt agynak szürke állományába létezik.

A dermengésről többet olvasni kívánókat az értekezés lefolytában többször említett szerzőkre utasítani bátorkodom.

Theses defendendae.

1. Celerior sanguinis motus cum læsione functionis febris audit. Quarin.

2. Sanguis bonus exiguus non detrahendus, copiosus audacter mittendus. Galenus.

3. Ut oculi valeant ita et homo. Stoll.

4. Subita morbi solutio per crisim tuta, sine hac recidivam prænunciat. Galenus.

5. Non sunt certa signa foetum in utero esse mortuum.

6. Fasciatio infantum summe vituperanda.

7. Morbum therapia simplicissima sanasse maxima medici gloria.

8. Medicus sciat multa, audiat plura, loquatur — pauca.

9. Aevi brevis gravissima causa — educatio incongrua.

10. Urbes morborum castra.
